

REGULACID® 20 mg

OMEPRAZOL 20 mg

Cápsulas
Industria Argentina
Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO:

¿Qué contiene REGULACID®?

Cada cápsula de **REGULACID®** 20 mg contiene microgránulos gastroresistentes de: Omeprazol: 20,0 mg, Excipientes c.s.

Acción Terapéutica:

Disminución de la producción de ácido estomacal.

¿Para qué se usa REGULACID®?

Regulacid está indicado para adultos y mayores de 18 años con acidez frecuente, o sea, cuando padecen acidez durante 1 a 4 días por semana.

¿Qué personas no pueden recibir REGULACID®?

Alergia a los componentes de la fórmula, menores de 18 años; si presenta acidez con mareos y transpiración.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Debe consultar con un médico en caso que aparezca alguno de los siguientes síntomas: dificultad o dolor al tragar, vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en la materia fecal. Estos pueden ser síntomas de una seria condición que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno. Debe consultar con un médico si Ud. está consumiendo alguno de estos medicamentos que pueden interactuar con omeprazol, ketoconazol, itraconazol (medicamentos contra las infecciones micóticas), warfarina (medicamento utilizado como anticoagulante), diazepam (sedante), digoxina (medicamento para el corazón) y teofilina (broncodilatadores).

Este producto puede modificar los valores de enzimas hepáticas en sangre. Si Ud. Posee antecedentes de acidez desde hace más de 3 meses o acidez con mareos o transpiración, deberá consultar al médico antes de tomar este medicamento, dado que ello podría ser síntoma de una condición más seria.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Las reacciones adversas más comunes observadas son: cefalea, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, gases, somnolencia, insomnio y sensación de hormigueo.

SI LOS SINTOMAS PERSISTEN POR MAS DE 5 DIAS O EMPEORAN, SUSPENDA EL MEDICAMENTO Y CONSULTE INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Cómo se usa REGULACID®?

REGULACID® cápsulas debe tomarse 1 vez al día, durante 14 días de tratamiento, con el estómago vacío, preferentemente 1 hora antes del desayuno. El producto solo debe tomarse con agua.

- No tomar más de una cápsula diaria.
- No tomar por más de 14 días sin prescripción médica. El efecto máximo del producto se obtiene a los tres días de tratamiento.

¿Qué debo hacer si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas:

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan:

(011) 4941-8650

Hospital de Clínicas Gral. San Martín:

(011) 4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. LAZAR

011-5550-2900

www.lazar.com.ar

ANMAT Responde

0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO O FARMACEUTICO

Presentaciones:

Envases conteniendo 14 cápsulas.



Conservación:

Conservar a una temperatura entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz, en su envase original.

Especialidad Medicinal Autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 44.585



LAZAR

DR. LAZAR y Cía S.A. Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro,
Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica:
Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de última revisión del prospecto: 22/04/2015

36954/1
P242

