

**DIUFORTAN®**  
**TAMSULOSINA CLORHIDRATO**  
Cápsulas de liberación controlada  
Industria Argentina  
Venta bajo receta

**INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO**

**¿Qué contiene Diufortan®?**

Diufortan® contiene Tamsulosina clorhidrato 0,4 mg. Excipientes c.s.

**Acción Terapéutica:**

Este medicamento relaja las fibras musculares involuntarias de la próstata y tracto urinario, facilitando el paso de orina y la micción. Además, disminuye la sensación de urgencia miccional.

**¿Para qué se usa Diufortan®?**

Diufortan® está indicado en varones para aliviar los síntomas urinarios causados por el agrandamiento de la próstata (hiperplasia benigna de próstata). Estos síntomas pueden incluir dificultad en la micción (chorro débil), goteo, urgencia y necesidad de orinar frecuentemente tanto por la noche como durante el día.

**¿Qué personas no pueden recibir Diufortan®?**

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento. Además si:

- Tiene antecedentes de sufrir descenso de la presión arterial al ponerse de pie, que le causa mareos o desmayos.
- Padece problemas graves de hígado.

Niños: no administre este medicamento a niños ni adolescentes menores de 18 años porque no tiene ninguna aplicación en esta población.

**¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?**

Si Ud. está tomando algún otro medicamento consulte a su médico antes de tomar Diufortan®.

Tenga especial cuidado con Diufortan® si:

- Padece mareos o desmayos, especialmente al incorporarse bruscamente o ponerse de pie. Diufortan® puede precipitar o agravar estos síntomas. Debe acostarse o sentarse hasta que los síntomas hayan desaparecido.
- Padece problemas graves de riñón, consulte a su médico.
- Va a someterse a una operación quirúrgica ocular debido a una opacidad del cristalino (cataratas). Es importante que informe a su oculista si está tomando o ha tomado anteriormente tamsulosina.

**¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?**

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento.

Los efectos secundarios más frecuentes con Diufortan® son mareos, visión borrosa, somnolencia y síncope (pérdida de la conciencia). No hay evidencia de que tamsulosina afecte a la capacidad para conducir y para utilizar máquinas; sin embargo tenga cuidado si comienza a tener mareos. Ante cualquier duda o aparición de algún síntoma durante el tratamiento, consulte con su médico.

**¿Cómo se usa Diufortan®?**

Siga exactamente las instrucciones de administración de Diufortan® indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Pida a su médico que le aclare cualquier cuestión que no entienda contenida en el prospecto que acompaña al medicamento.

La dosis normal es de una cápsula al día. Puede tomar tamsulosina con o sin comida, preferiblemente a la misma hora cada día.

La cápsula debe tragarse entera. Es importante que no rompa ni mastique la cápsula ya que esto afectará el buen funcionamiento de la tamsulosina.

Si ha olvidado tomar Diufortan® como se le ha recomendado, puede tomar su dosis más tarde en el mismo día. En caso de que haya omitido la dosis de un día, tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome dosis doble para compensar la dosis olvidada.

No se auto-medique con Diufortan®. Es importante que usted no tome mayor cantidad de Diufortan® que lo indicado por su médico. Dosis mayores o más frecuentes no necesariamente aceleran ni dan mejores resultados.

**¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?**

Si toma más tamsulosina de la que debe, su presión arterial puede disminuir de repente. Puede sufrir mareos, debilidad, vómitos, diarrea y desmayos. Recuéstese para minimizar los efectos de la presión arterial baja y consulte a su médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o concurra al hospital más cercano o comuníquese con los siguientes centros de toxicología:

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez": (011) 4962-6666 / 2247  
Hospital A. Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777  
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650  
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011)4961-6001

**¿Tiene Ud. alguna pregunta?**

Laboratorio Dr. Lazar  
011-5550-2900  
www.lazar.com.ar

ANMAT Responde  
0800-333-1234

**CONSERVACIÓN:**

Mantener lejos del calor y la luz solar directa, a una temperatura ambiente entre 15 y 30 °C, en lugar seco.

**PRESENTACIONES:**

Envases conteniendo 30 y 60 cápsulas de liberación controlada.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Especialidad medicinal autorizada por  
el Ministerio de Salud. Certificado N° 58.279



**Dr. LAZAR y Cia. S.A.Q. e I.**  
Av. Vélez Sársfield 5853/5855  
B1605EPI Munro, Pcia. De Buenos Aires  
Directora Técnica: Daniela A. Casas,  
Farmacéutica y Bioquímica.

Elaborado en Vicrofer S.R.L. - Santa Rosa 3676  
(1644) Victoria - Pcia. de Buenos Aires.

Última revisión: 2/02/2017



36767/1  
P297