

IBUMULTIN®

IBUPROFENO

Comprimidos
Venta libre
Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene IBUMULTIN®?

Cada comprimido de 400 mg contiene:

Ibuprofeno 400,000 mg

Excipientes: Almidón pregelatinizado; Celulosa microcristalina; Laurilsulfato de sodio; Almidón de maíz; Dióxido de silicio coloidal; Povidona (K-90); Acido esteárico; Croscarmellose sódica; Talco.

Acción Terapéutica:

Analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Calma el dolor, alivia la inflamación, baja la fiebre.

¿Para qué se usa IBUMULTIN®?

IBUMULTIN® alivia los dolores de origen inflamatorio y no inflamatorio como por ejemplo: dolor de espalda, dolores musculares, dolores menstruales, dolor de cabeza, dolores de dientes, dolor de garganta. En cuadros febriles, **IBUMULTIN®** baja la fiebre.

¿Qué personas no pueden recibir IBUMULTIN®?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a algunos de los componentes del medicamento, ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios, o si padece ciertas enfermedades como enfermedades del hígado, corazón y riñón. Menores de 15 años.

Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Si usted padece alguna enfermedad del corazón o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol o triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, si usted es mayor de 65 años, si padece asma, alergias, problemas de estómago (ardor de estómago): Consulte a su médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas en la sangre), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

¿Cómo se usa IBUMULTIN®?

Tomar un comprimido cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan. La dosis diaria no debe superar los 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas. Deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días por la fiebre.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre. Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez": (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650

Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011)4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar

011-5550-2900

www.lazar.com.ar

ANMAT Responde

0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO O FARMACEUTICO

Conservación:

Conservar a una temperatura entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz, en su envase original.

No utilizar este medicamento luego de la fecha de vencimiento.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 39.587

Presentaciones:

IBUMULTIN® Comprimidos de 400 mg x 10 y x 100 (dispenser).



LAZAR

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.

Av. Vélez Sársfield 5853/5855

B1605EPI Munro,

Pcia. de Buenos Aires

Directora Técnica:

Daniela A. Casas, Farm. y Bio.

Última revisión del prospecto: 5/7/2013

36848/3

P178

