

FANGAN® PLUS

CENTELLA ASIÁTICA - METRONIDAZOL- MICONAZOL - NEOMICINA - POLIMIXINA

Óvulos vaginales
Venta bajo receta
Industria Argentina

Fórmula cuali-cuantitativa:

Cada óvulo vaginal contiene:

Metronidazol	300,00 mg
Miconazol nitrato	100,00 mg
Neomicina sulfato	48,80 mg
Polimixina sulfato	4,40 mg
Centella asiática (L.) Urban	15,00 mg
Lactosa	410,00 mg
Witepsol H5	1.491,80 mg

Acción Terapéutica:

En FANGAN® PLUS se combinan una acción reepitelizante, regeneradora y protectora de tejido de la Centella Asiática, con la eficacia antiinfecciosa de los restantes principios activos, a nivel de la mucosa vulvovaginal. La Centella Asiática estimula el proceso de granulación y promueve una adecuada epitelización, el Miconazol aporta acción antimicótica, el Metronidazol su acción tricomonocida, giardicida y amebicida, mientras que la Neomicina y la Polimixina cubren un amplio espectro bacteriano, actuando sobre gérmenes gram-positivos y gram-negativos.

Indicaciones:

Tratamiento local de las vulvovaginitis específicas e inespecíficas, particularmente cuando se asocian a lesiones de la pared vaginal, vaginitis, vaginosis, cervicovaginitis, vulvitis irritativas o bacterianas, candidiasis, tricomoniasis, leucorrea de cualquier etiología.

Posología y forma de administración:

Comenzar el tratamiento con 1-2 óvulos diarios. Una vez mejorados los síntomas, continuar con 1 óvulo al día, al acostarse, hasta la completa resolución del proceso. Retirar el óvulo del envoltorio e introducirlo profundamente por vía vaginal. Aplicar durante un lapso de 6 a 10 días. Duración del tratamiento sujeta a criterio médico.

Efectos secundarios:

Raramente puede presentarse ardor vulvovaginal, irritación y prurito. Dado que se desconoce la proporción en que los principios activos se absorben a través de la mucosa vaginal, no puede excluirse la posibilidad de efectos sistémicos. El riesgo se eleva en pacientes con insuficiencia renal.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto o a derivados imidazólicos. Primer trimestre del embarazo. Lactancia. Pacientes con discrasias sanguíneas. Enfermedades activas del SNC.

Precauciones y advertencias:

Administrar con precaución a pacientes con insuficiencia hepática severa. No emplear el producto antes del coito, por dificultar la fecundación. El uso del producto no previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. La base del óvulo vaginal puede alterar el látex de preservativos y diafragmas.

Interacciones medicamentosas:

Evitar los lavados vaginales con sustancias alcalinas.
Debido a una baja absorción de las drogas por vía tópica, no pueden excluirse interacciones sistémicas, por lo tanto se desaconseja la aso-

ciación con alcohol (efecto antabús), warfarina, dicumarínicos (potenciación del efecto anticoagulante) y disulfiram.

Sobredosis y tratamiento:

Administrado el producto por la vía indicada, no existe riesgo de sobredosis.

Ante la eventualidad de ingesta accidental concurrir al hospital más cercano o comunicarse a los Centros de Toxicología:

Hospital de Clínicas Gral. San Martín:
(011) 4961-6001

Hospital de Niños R. Gutiérrez:
(011) 4962-6666/2247

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan:
(011) 4941-8650

Hospital Posadas:
(011) 4658-7777 4654-6648

Presentación:

Envases conteniendo 6 y 12 óvulos vaginales.

Conservación:

Consérvese a temperatura entre 15 y 30°C.

**MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Especialidad Medicinal Autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado N° 54.455



LAZAR

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro,
Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica:

Daniela A. Casas, Farm. y Bioq.

Fecha última revisión prospecto:
15/04/2008

36751/5
P117