

H 36 LAZAR® TADALAFILO 5 mg

Comprimidos recubiertos
Venta bajo receta
Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR A TOMAR ESTE MEDICAMENTO, PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USTED.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

En este prospecto:

1. Qué contiene H 36 LAZAR® y qué es el tadalafilo
2. Para qué se utiliza
3. Quiénes no pueden recibir este medicamento
4. Antes de tomar H 36 LAZAR®
5. Posibles efectos adversos.
6. Cómo tomar H 36 LAZAR®
7. Información adicional para el paciente

1. ¿Qué contiene H 36 LAZAR® y qué es el tadalafilo?

H 36 LAZAR® comprimidos 5 mg contiene: Tadalafilo 5 mg. Excipientes c.s.

El principio activo tadalafilo pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5.

2. ¿Para qué se utiliza?

H 36 LAZAR® está indicado en hombres adultos para el tratamiento de:

- Disfunción eréctil: Ésta se produce cuando un hombre no puede obtener o mantener una erección firme, adecuada para una actividad sexual satisfactoria. H 36 LAZAR® ha demostrado una mejora significativa en la capacidad para obtener una erección duradera del pene adecuada para la actividad sexual. Es importante advertirle que H 36 LAZAR® no es efectivo si no existe estimulación sexual. Por lo tanto usted y su pareja deberán estimularse del mismo modo en el que lo harían si no estuviese tomando un medicamento para la disfunción eréctil.

- Síntomas urinarios asociados con una enfermedad común llamada hiperplasia benigna de próstata: Ésta se produce cuando la próstata aumenta de tamaño con el paso de los años. Los síntomas incluyen dificultad para empezar a orinar, sensación de que la vejiga no se ha vaciado completamente, necesidad de orinar con mayor frecuencia, incluso por la noche. Tadalafilo mejora el riego sanguíneo y relaja los músculos de la próstata y de la vejiga, lo que puede reducir los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata.

3. ¿Quiénes no pueden recibir este medicamento?

No tome H 36 LAZAR®

- si es alérgico a tadalafilo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento
- si está tomando cualquier tipo de nitratos orgánicos o donadores de óxido nítrico tales como el nitrito de amilo. Este es un grupo de medicamentos ("nitratos") que se utilizan para el tratamiento de la angina de pecho ("dolor de pecho"). Se ha visto que tadalafilo aumenta los efectos de estos medicamentos. Si está tomando cualquier tipo de nitrato o no está seguro, dígaselo a su médico.
- si padece una enfermedad grave de corazón o recientemente ha sufrido un ataque cardíaco.
- si recientemente ha sufrido un accidente cerebrovascular.
- si tiene la tensión arterial baja o la tensión alta y no controlada.
- si alguna vez ha presentado pérdida de visión debida a neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, una enfermedad descrita algunas veces como "infarto del ojo".

No se debe usar en niños ni en adolescentes menores de 18 años ni en mujeres.

4. Antes de tomar H 36 LAZAR®

Consulte a su médico antes de empezar a tomar H 36 LAZAR®.

Sea consciente de que las relaciones sexuales conllevan un posible riesgo en pacientes con problemas de corazón, debido al esfuerzo adicional que suponen para el mismo. Si usted tiene un problema cardíaco consulte con su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

No tome H 36 LAZAR® si ya está utilizando nitratos.

Algunos medicamentos pueden verse afectados por H 36 LAZAR® o pueden afectar el buen funcionamiento de H 36 LAZAR®. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando:

- un alfa bloqueante (utilizados a veces para tratar la hipertensión arterial y el aumento del tamaño de la próstata).
- otros medicamentos para tratar la hipertensión arterial.
- medicamentos como ketoconazol (para el tratamiento de las infecciones fúngicas) o inhibidores de la proteasa para el tratamiento del sida o de la infección por VIH.
- fenobarbital, fenitoína y carbamazepina (medicamentos anticonvulsivos).
- rifampicina, eritromicina, claritromicina o itraconazol.

No tome H 36 LAZAR® simultáneamente con ningún otro tratamiento para la disfunción eréctil.

5. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, H 36 LAZAR® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Estos efectos son generalmente de intensidad leve a moderada.

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos, deje de utilizar el medicamento y busque ayuda médica inmediatamente:

- reacciones alérgicas incluyendo erupciones (poco frecuente).
- dolor de pecho - no use nitratos pero busque ayuda médica inmediatamente (poco frecuente).
- pérdida de visión repentina (frecuencia rara).

• erección prolongada y posiblemente dolorosa después de tomar **H 36 LAZAR®** (frecuencia rara). Si usted sufre este tipo de erección, que puede tener una duración continua de más de 4 horas, debe contactar con un médico inmediatamente.

Un efecto adverso muy frecuente de **H 36 LAZAR®** es dolor de cabeza y puede afectar a más de 1 de cada 10 personas.

Otros efectos adversos que se han comunicado:

Frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 10 personas): dolor de espalda, dolores musculares, enrojecimiento de la cara, congestión nasal, mareo, indigestión y reflujo.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

6. ¿Cómo tomar H 36 LAZAR®?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.

En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Los comprimidos de **H 36 LAZAR®** son para administración por vía oral únicamente en hombres. Trague el comprimido entero con un poco de agua. Los comprimidos se pueden tomar con o sin comida. El consumo de alcohol puede disminuir temporalmente su presión sanguínea. Si usted ha tomado o está planeando tomar **H 36 LAZAR®**, evite el consumo excesivo de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de mareos al ponerse de pie.

Para el tratamiento de la disfunción eréctil

La dosis recomendada es de un comprimido de 5 mg una vez al día, aproximadamente a la misma hora. Su médico puede ajustar la dosis a 2,5 mg en función de su respuesta a **H 36 LAZAR®**.

No tome **H 36 LAZAR®** más de una vez al día.

Para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata

La dosis es de un comprimido de 5 mg una vez al día, aproximadamente a la misma hora.

Si tiene hiperplasia benigna de próstata y disfunción eréctil, la dosis sigue siendo de un comprimido de 5 mg una vez al día.

No debe tomar **H 36 LAZAR®** más de una vez al día. Si toma más **H 36 LAZAR®** del que debe consulte con su médico. Puede experimentar efectos adversos descritos en la sección 5.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

7. Información adicional para el paciente

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar
ANMAT Responde
0800-333-1234



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservación:

Conservar en lugar seco, a menos de 30°C.
No utilizar luego de la fecha de vencimiento.

Presentación:

Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Especialidad Medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud.
Certificado N° 52.105



LAZAR

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Ultima revisión del prospecto: 30/08/2016



Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez" : (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-8001

37029/1
P291