PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

FLEBOSMINA®
HIDROSMINA
Cápsulas
Gel
Industria Argentina
Venta bajo receta

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o no mejora después de 5 ó 6 días.

Contenido del prospecto:

1. Qué es FLEBOSMINA y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar FLEBOSMINA
3. Cómo usar FLEBOSMINA
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de FLEBOSMINA
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es FLEBOSMINA y para qué se utiliza

Flebosmina contiene hidrosmina, un medicamento perteneciente al grupo de los venotónicos y vasoprotectores.

Actúa aumentando el tono de las venas y la resistencia de los capilares (pequeños vasos sanguíneos), lo que favorece la circulación venosa.

Flebosmina está indicado en adultos para:

el alivio a corto plazo (durante 2-3 meses) del edema y síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica (dolor, pesadez de piernas, hinchazón, etc.).La forma gel se utiliza para el alivio local de los síntomas asociados a trastornos venosos superficiales.

La forma cápsulas se utiliza para el tratamiento sintomático de la insuficiencia venosa crónica.

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar FLEBOSMINA

No use FLEBOSMINA

- si es alérgico a hidrosmina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- en afecciones de la piel, tales como dermatitis, eczemas o urticarias.
- sobre mucosas, ni zonas de la piel irritadas o heridas.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar Flebosmina.
Si los síntomas empeoran o no mejoran después de varios días de tratamiento con el gel o después del período de tratamiento indicado con las cápsulas, consulte a su médico.
El gel es únicamente para **uso externo**.
Evite el contacto del gel con los ojos y las mucosas.
Las medidas higiénico-dietéticas como evitar permanecer mucho tiempo de pie, elevar las piernas cuando sea posible, controlar el peso corporal y utilizar medias de compresión pueden ayudar a mejorar los síntomas de la insuficiencia venosa.

Niños y adolescentes

- no se debe utilizar en niños y adolescentes a no ser que su médico se lo indique.

Uso de FLEBOSMINA con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.
No se conocen interacciones con los alimentos ni con otros medicamentos, en todo caso nunca debe usar otro medicamento por iniciativa propia sin que se lo haya recomendado su médico.
No aplicar simultáneamente en la misma zona que otros medicamentos de uso cutáneo.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se dispone de datos clínicos con FLEBOSMINA relativos al uso de hidrosmina en mujeres embarazadas. Como medida de precaución, no se recomienda el uso de FLEBOSMINA durante el embarazo, a no ser que, a criterio del médico, considere que los beneficios potenciales de su administración superan los posibles riesgos.
No se dispone de datos clínicos relativos al uso de hidrosmina en mujeres en periodo de lactancia. Se desconoce si hidrosmina se excreta por leche materna, por lo que no se recomienda su uso durante la lactancia.

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

Conducción y uso de máquinas
La influencia de FLEBOSMINA sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

3. Cómo usar FLEBOSMINA
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Cápsulas
La dosis habitual en adultos es la indicada por su médico.
La dosis recomendada de Flebosmina es de 1 cápsula de 200 mg 3 veces al día, por vía oral, acompañada de un vaso de agua.
La duración del tratamiento suele ser de varias semanas a algunos meses, según la evolución de los síntomas.

Gel
Flebosmina gel se aplica por vía cutánea.
Aplicar una pequeña cantidad de gel sobre la zona afectada 2 a 3 veces al día, realizando un suave masaje hasta su completa absorción.
Lávese las manos después de cada aplicación, salvo que la zona tratada sean las manos.
No aplicar sobre heridas abiertas ni sobre piel irritada.
Si los síntomas empeoran o no mejoran después de unos días de tratamiento, consulte a su médico.

Niños y adolescentes
No se debe utilizar en niños y adolescentes a no ser que su médico se lo indique.

Si usa más FLEBOSMINA del que debe:
Hasta ahora no se han comunicado intoxicaciones con este medicamento, ni siquiera en casos de sobredosis accidental.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría " Ricardo Gutiérrez": (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ 4658-7777

Si olvidó usar FLEBOSMINA
No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Aplíquelo tan pronto como lo recuerde y prosiga con la pauta habitual.

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Flebosmina puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos observados con hidrosmina son generalmente leves y poco frecuentes.

Pueden aparecer:

- molestias gastrointestinales leves
- reacciones cutáneas como enrojecimiento, picazón o irritación en el lugar de aplicación del gel

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a: Laboratorio Dr. Lazar

011-5550-2900

www.lazar.com.ar

ANMAT

https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos

0800-333-1234

5. Conservación de FLEBOSMINA

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura inferior a los 25ºC y evitar de mantener a temperaturas superiores.

6. Contenido del envase e información adicional

Fórmula:

Cada cápsula contiene:

Hidrosmina	200,00 mg
Estearato de magnesio	2,00 mg

Cada 100 g de gel contiene:

Hidrosmina	2,000	g
Carbomero	0,750	g
Trietanolamina	0,900	g
Metilparabeno	0,100	g
Propilparabeno	0,050	g
Agua purificada c.s.p.	100,000	g

Conservación

Mantener fuera del alcance de los niños.

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

Conservar a temperatura inferior a los 25ºC y evitar de mantener a temperaturas superiores.

Contenido del envase e información adicional
Envases conteniendo 10, 20, 30, 50, 60, 100, 500 y 1000 cápsulas siendo los dos últimos de uso exclusivo hospitalario.
Envases conteniendo 15, 20, 25, 30, 50, 60 y 100 g de gel.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 54.525

Dr. LAZAR y Cía S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855 B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas, Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de última revisión del prospecto:.....

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-97339329-APN-DERM#ANMAT

FLORIDA, BUENOS AIRES
Martes 6 de Octubre de 2026

Referencia: INFORMACION PARA EL PACIENTE PROD. FLEBOSMINA EX-2026-24587920- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.06 11:12:53 -03:00

Pablo Marcelo Lopez Schimpf
Profesional de la Salud
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.06 11:12:54 -03:00