

MULTIN®

DIPIRONA - PARACETAMOL

Jarabe
Industria Argentina
Venta bajo receta

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Multin®?

Cada 100 ml contiene: Dipirona sódica monohidrato (equivalente a 7,7 g de Dipirona) 8,72 g; Paracetamol: 2,400 g; Excipientes c.s.

Acción Terapéutica:

Este medicamento es un analgésico y antipirético (antifebril)

¿Para qué se usa Multin®?

Está indicado para el tratamiento sintomático de dolores de intensidad ligera a moderada y/o fiebre, como dolores de cabeza, síntomas gripales, dolores dentales, musculares cuando no responde a una sola droga.

¿Qué personas no pueden recibir Multin®?

No use este medicamento si Ud sabe que es alérgico a algunos de los ingredientes del medicamento, o si padece ciertas enfermedades como: una enfermedad grave del hígado, déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, antecedentes de porfiria, antecedentes de agranulocitosis o anemia.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Los ancianos pueden presentar mayor susceptibilidad a los efectos del medicamento.

Si usted es diabético o sufre de gota, recuerde que el paracetamol puede falsear los datos de los análisis de glucemia y de ácido úrico. No consuma bebidas alcohólicas mientras esté tomando Multin®.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, puede dañar el hígado a dosis altas o en tratamientos prolongados. También pueden aparecer erupciones cutáneas y alteraciones sanguíneas.

¿Cómo se usa Multin®?

Jarabe: 0,5 ml por kg de peso por día, como dosis total que debe ser dividida en tres tomas diarias.

Si el trastorno (fiebre o dolor) que motivó el tratamiento con Multin® persistiera durante más de 3 días, o aún empeorara, consulte nuevamente al médico.

No se automedique con Multin®. Es importante que usted no ingiera mayor cantidad de Multin® que lo indicado por su médico. La sobredosis de paracetamol produce un grave daño hepático y renal. Si accidentalmente pudo haber recibido una dosis excesiva del medicamento, consulte de inmediato aunque no sienta molestia alguna. Los síntomas de intoxicación pueden aparecer con cierto retraso luego de la ingestión, pero el tratamiento debe comenzar cuanto antes. Podría ser que persistiera algún problema que necesite un tratamiento más específico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría "Ricardo Gutiérrez":

(011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650

Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Laboratorio Dr. LAZAR: 011-5550-2900 -

www.lazar.com.ar

ANMAT Responde: 0800-333-1234

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservación:

Conservar en lugar fresco y seco, entre 15 y 30°C.

Proteger de la luz solar directa. No utilizar luego de la fecha de vencimiento.

"Ante cualquier inconveniente con el medicamento el paciente puede llenar la ficha que está en la

Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT

responde 0800-333-1234".

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 25.655



DR. LAZAR y Cia S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sársfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de última revisión: 18/12/2013

36865/2
P221