PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

NEBICOR® D 5/12,5
NEBIVOLOL 5 mg
HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg

Comprimidos recubiertos
Venta bajo receta
Industria Argentina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Si tiene alguna duda, consulte a su médico, o farmacéutico.
Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlas.
Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. ¿Qué es Nebicor® D 5/12,5 y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Nebicor® D 5/12,5?
3. ¿Cómo tomar Nebicor® D 5/12,5?
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Nebicor® D 5/12,5
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Nebicor® D 5/12,5 y para qué se utiliza?

Nebicor® D 5/12,5 contiene dos principios activos: nebivolol e hidroclorotiazida.
El nebivolol pertenece a un grupo de medicamentos llamados betabloqueantes. Actúa reduciendo la frecuencia cardíaca y ayudando a relajar los vasos sanguíneos.
La hidroclorotiazida es un diurético (medicamento que aumenta la eliminación de orina), que ayuda a disminuir la presión arterial al eliminar el exceso de líquidos y sal del organismo.
Nebicor® D 5/12,5 está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial (presión arterial alta) en pacientes cuya presión no está adecuadamente controlada con uno solo de los componentes administrado por separado.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Nebicor® D 5/12,5?

No tome Nebicor® D 5/12,5 si:

- Si usted es alérgico a nebivolol, o a hidroclorotiazida, o a cualquiera de los otros componentes de estemedicamento (incluidos en la sección 6).

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial
DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT

- Si usted es alérgico (hipersensible) a otras sustancias derivadas de sulfonamida (como la hidroclorotiazida, la cual es un medicamento derivado de la sulfonamida).
- Si usted padece una o más de las siguientes alteraciones:
  -Latido del corazón muy lento (menos de 60 latidos por minuto).
  -Otras alteraciones graves del ritmo cardiaco (por ejemplo enfermedad del seno, bloqueo seno-atrial, bloqueo atrioventricular de 2 y 3er grado).
  -Ha sufrido recientemente un episodio de insuficiencia cardiaca o un empeoramiento de la misma, o está recibiendo tratamiento intravenoso para ayudar a trabajar el corazón, después de sufrir un colapso circulatorio debido a una insuficiencia cardiaca aguda.
  -Presión arterial baja.
  -Problemas graves de circulación en brazos o piernas.
  -Feocromocitoma, un tumor localizado en la parte superior de los riñones (glándulas adrenales), que no está siendo tratado.
  -Problemas graves de riñón, ausencia completa de orina (anuria).
  -Trastornos metabólicos caracterizados por acidosis metabólica (p.ej. cetoacidosis diabética).
  -Asma o respiración dificultosa (actualmente o en el pasado).
  -Trastornos de la función del hígado.
  -Niveles altos de calcio en sangre y niveles bajos de potasio y sodio en sangre que son persistentes y resistentes al tratamiento.
  -Niveles altos de ácido úrico con síntomas de gota.

Si no está seguro de si alguna de las situaciones anteriores se aplica a usted, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Advertencias y precauciones
Informe a su médico si usted padece o desarrolla alguno de los siguientes problemas:
Un tipo de dolor torácico, debido a un espasmo espontáneo de las arterias del corazón, denominado Angina de Prinzmetal.
Bloqueo cardiaco de 1er grado (alteración leve de la conducción cardiaca que afecta al ritmo cardiaco).
Latido del corazón anormalmente lento.
Insuficiencia cardiaca crónica que no está siendo tratada.
Lupus eritematoso (un trastorno del sistema inmunitario, que es el sistema de defensa de su cuerpo).
Psoriasis (una enfermedad de la piel caracterizada por manchas escamosas de color rosa), o si ha padecido alguna vez psoriasis.
Hiperactividad de la glándula tiroidea: este medicamento puede enmascarar los signos debidos a esta alteración, tales como frecuencia cardiaca anormalmente alta.

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT

Circulación deficiente en brazos o piernas, como por ejemplo la enfermedad o síndrome de Raynaud's, dolor al caminar parecido a un calambre.
Alergias: este medicamento puede intensificar su reacción al polen u otras sustancias a las que sea alérgico.
Problemas respiratorios crónicos.
Diabetes: este medicamento puede enmascarar los signos de alarma producidos por una bajada de los niveles de azúcar (por ejemplo palpitaciones, latido del corazón rápido) y podría aumentar el riesgo de hipoglucemia grave cuando se utiliza con cierto tipo de medicamentos antidiabéticos llamados sulfonilureas (por ejemplo, gliquidona, gliclazida, glibenclamida, glipizida, glimepirida o tolbutamida);su médico le aconsejará controlar el azúcar en sangre más a menudo mientras tome Nebicor D, ya que puede ser necesario ajustar la dosis de los medicamentos antidiabéticos que esté tomando.
Problemas renales: su médico comprobará la función de sus riñones para asegurarse que no empeora. Si usted tiene problemas graves de riñón no tome Nebicor D.
Si usted tiende a tener los niveles de potasio en sangre bajos, y especialmente si usted sufre el síndrome de Q-T prolongado (un tipo de anormalidad en el ECG) o usted está tomando digitálicos (para ayudar al corazón a latir); es más probable que usted tenga el potasio en sangre bajo si sufre cirrosis hepática, o ha sufrido una pérdida de agua demasiado rápida debido a un tratamiento diurético fuerte, o si su ingesta de potasio con la comida y la bebida es inadecuada.
Si usted tiene que someterse a una intervención quirúrgica, informe siempre a su anestesista que está tomando Nebicor D antes de ser anestesiado.
Si ha tenido cáncer de piel o si le aparece una lesión de la piel inesperada durante el tratamiento. El tratamiento con hidroclorotiazida, en particular su uso a largo plazo a dosis altas, puede aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel y labios (cáncer de piel no-melanoma). Proteja la piel de la exposición al sol y a los rayos UV mientras esté tomando Nebicor D.
Si experimenta una disminución de la visión o dolor ocular, podrían ser síntomas de acumulación de líquido en la capa vascular del ojo (derrame coroideo) o un aumento de la presión en el ojo y se pueden producir en un plazo de entre unas horas y unas semanas después de tomar Nebicor D. Esto puede conducir a la pérdida de visión permanente, si no se trata. Si ha padecido previamente alergia a penicilinas o sulfonamidas, puede tener mayor riesgo de desarrollarlo.
Si ha tenido problemas respiratorios o pulmonares (como inflamación o líquido en los pulmones) tras la toma de hidroclorotiazida en el pasado. Si presenta disnea o dificultad para respirar grave después de tomar Nebicor D, acuda al médico inmediatamente.
Nebicor D puede aumentar los niveles de grasas en la sangre y el ácido úrico. Puede afectar los niveles de ciertas sustancias químicas en sangre, que se denominan electrolitos: su médico se los controlará de vez en cuando mediante una analítica sanguínea.
La hidroclorotiazida en Nebicor D puede provocar hipersensibilidad en su piel a la luz del sol o a la luz artificial UV. Si durante el tratamiento le aparece un sarpullido, picor o piel sensible, deje de tomar Nebicor D e informe a su médico.
Test antidopaje: Nebicor D puede producir un resultado analítico positivo en los test antidopaje.

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT
Página 4 de 28

Niños y adolescentes
No se recomienda el uso de Nebicor D en niños y adolescentes debido a la ausencia de datos sobre el uso de este medicamento en este tipo de pacientes.

Análisis de sangre
Durante el tratamiento, su médico puede solicitar análisis periódicos para controlar:
• Función renal
• Función hepática
• Niveles de potasio, sodio y otros electrolitos
• Glucosa en sangre

Toma de otros medicamentos
Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento:
Medicamentos que, al igual que Nebicor D, pueden tener un efecto sobre la presión arterial y/ o la función del corazón:
-Medicamentos para controlar la presión arterial o medicamentos para tratar problemas del corazón (tales como amiodarona, amlodipino, cibenzolina, clonidina, digoxina, diltiazem, disopiramida,dofetilida, felodipino, flecainida, guanfacina, hidroquinidina, ibutilida, lacidipino, lidocaína, mexiletina,metildopa, moxonidina, nicardipino, nifedipino, nimodipino, nitrendipino, propafenona, quinidina, rilmenidina, sotalol, verapamilo).
-Sedantes y medicamentos para la psicosis (una enfermedad mental), por ejemplo amisulpirida, barbitúricos (también usados para la epilepsia), clorpromazina, ciamemazina, droperidol, haloperidol, levomepromazina, derivados narcóticos, fenotiazina (también usado para vómitos y náuseas), pimozida, sulpiride, sultopride, tioridazina, tiaprida, trifluoperazina.
-Medicamentos para la depresión, por ejemplo amitriptilina, paroxetina, fluoxetina.
-Medicamentos usados para la anestesia durante una operación.
-Medicamentos para el asma, para la congestión nasal y para tratar ciertas alteraciones oculares como el glaucoma (incremento de la presión del ojo) o dilatación (ensanchamiento) de la pupila.
-Medicamentos para la diabetes, como insulina o antidiabéticos orales.
-Baclofeno (un medicamento antiespasmódico).
-Amifostina (un medicamento protector utilizado durante el tratamiento del cáncer).

Medicamentos cuyo efecto o toxicidad puede ser aumentado por Nebicor D:
Litio (utilizado como estabilizador del humor).
Cisaprida (utilizado para problemas digestivos).
Bepridil (utilizado para la angina de pecho).
Difemanil (utilizado para tratar la sudoración excesiva).
Medicamentos para las infecciones: eritromicina administrada por infusión o inyección, pentamidina yesparfloxacino, amfotericina y penicilina G sódica, halofantrina (usado para la malaria).

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial
DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT
Página 4 de 28

Vincamina (usado para problemas de circulación cerebral).
Mizolastina y terfenadina (usado para alergias).
Diuréticos y laxantes.
Medicamentos para tratar la inflamación aguda: esteroides (por ejemplo cortisona y prednisona), ACTH(hormona adrenocorticotrópica) y medicamentos derivados del ácido salicílico (por ejemplo ácido acetilsalicílico/ aspirina y otros salicilatos).
Carbenoxolona (usado para el ardor de estómago y la úlcera de estómago).
Sales de calcio (usadas como suplemento para la salud de los huesos).
Medicamentos utilizados para relajar los músculos (por ejemplo tubocurarina).
Diaxozida (usado para tratar los niveles bajos de azúcar en sangre y la presión arterial elevada).
Amantadina, un medicamento antiviral.
Ciclosporina, utilizado para suprimir la respuesta inmunitaria del cuerpo.
Medios de contraste iodados, utilizados para contrastar en escáneres de rayos X.
Medicamentos anticancerígenos (por ejemplo ciclofosfamida, fluorouracilo, metotrexato).

Medicamentos cuyo efecto puede ser disminuido por Nebicor D:
Medicamentos que disminuyen el azúcar en sangre (insulina y medicamentos antidiabéticos orales, metformina).
Medicamentos para la gota (por ejemplo alopurinol, probenecid y sulfinpirazona).
Medicamentos como la noradrenalina, utilizados para tratar la presión arterial baja y la frecuencia cardiaca lenta.
Medicamentos para el dolor y la inflamación (medicamentos antiinflamatorios no esteroideos), ya que
pueden bajar la presión arterial disminuyendo el efecto de Nebicor D.
Medicamentos para tratar un exceso de acidez en el estómago o úlceras (medicamentos antiácidos): debe tomar Nebicor D durante la comida, y el antiácido entre comidas.

Nebicor® D 5/12,5 con alimentos y alcohol
Puede tomarse con o sin alimentos.
Evite el consumo excesivo de alcohol, ya que puede potenciar el efecto hipotensor.

Embarazo y lactancia
No tome Nebicor® D 5/12,5 si está embarazada, cree que podría estarlo o está en período de lactancia.
Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento durante el embarazo o la lactancia.

Conducción y uso de máquinas
Este medicamento puede producir mareos o cansancio. Si esto ocurre, no conduzca ni utilice maquinaria.

Nebicor D contiene lactosa

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT
P 0013 de 28

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consúltele antes de tomar este medicamento

3. ¿Cómo tomar Nebicor® D 5/12,5?
Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico.
La dosis habitual es de 1 comprimido una vez al día, preferentemente a la misma hora cada día.
Tome el comprimido con un vaso de agua.
No administrar a niños ni adolescentes menores de 18 años.

Si toma más Nebicor® D 5/12,5 del que debe
Los síntomas y signos más frecuentes de sobredosis son latido del corazón muy lento (bradicardia), presión arterial baja con posibilidad de desmayo, dificultad para respirar como en el asma, insuficiencia cardiaca aguda, eliminación de orina excesiva con la deshidratación consecuente, náuseas y somnolencia, espasmos musculares, alteraciones del ritmo cardiaco (especialmente si está tomando digitálicos o medicamentos para tratar problemas del ritmo cardiaco).
Ante una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología:
Hospital de Clínicas Gral. San Martín: (011) 4961-6001
Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4941-8650
Hospital Posadas: (011) 4658-7777 4654-6648

Si olvidó tomar Nebicor® D 5/12,5
Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde.
Si está cerca de la siguiente dosis, omita la dosis olvidada.
No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento
No suspenda el tratamiento sin consultar previamente con su médico. La suspensión brusca puede empeorar su enfermedad.

4. Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, Nebicor® D 5/12,5 puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Deje de tomar el medicamento y consulte inmediatamente si presenta:
• Reacción alérgica grave (hinchazón de cara, labios o garganta, dificultad para respirar).
• Disminución marcada de la frecuencia cardíaca.
• Desmayo o presión arterial muy baja.
• Dolor ocular intenso o pérdida repentina de visión.

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial
DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT
P 10027 de 28

Se han notificado los siguientes efectos adversos con el uso de nebivolol:
Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):
Dolor de cabeza.
Mareo.
Cansancio.
Sensación poco común de quemazón, cosquillas o hormigueo en la piel.
Diarrea.
Estreñimiento.
Náuseas.
Dificultad para respirar, sensación de falta de aire.
Sudoración de manos y pies.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):
Latido del corazón lento u otras alteraciones cardiacas.
Presión arterial baja.
Dolor en las piernas parecido a un calambre al caminar.
Visión anormal.
Impotencia sexual
Sentimiento de depresión.
Dificultad para la digestión, gases en el estómago o intestino, vómitos.
Erupción de la piel, picor.
Dificultad para respirar como en el asma, debido a contracción repentina de los músculos de alrededor de las vías respiratorias (espasmo bronquial).
Pesadillas.

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas):
Desmayo.
Empeoramiento de la psoriasis, una enfermedad de la piel caracterizada por manchas escamosas de color rosa.

Los siguientes efectos adversos se han notificado tan solo en algunos casos aislados:
Reacciones alérgicas en todo el cuerpo, con erupción cutánea generalizada (reacciones de hipersensibilidad);
Hinchazón súbita, especialmente alrededor de los labios, de los ojos, o de la lengua con posible dificultad respiratoria aguda (angioedema).
Erupción en la piel caracterizada por ronchas rosadas, con relieve, que producen picor, de causa alérgica o noalérgica (urticaria).

Se han notificado los siguientes efectos adversos con el uso de hidroclorotiazida:
Frecuencia no conocida: Cáncer de piel y labios (cáncer de piel no-melanoma)
Reacciones alérgicas
Reacción alérgica en todo el cuerpo (reacción anafiláctica).

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT

Corazón y circulación
Alteraciones del ritmo cardiaco, palpitaciones.
Cambios en el electrocardiograma.
Desmayo repentino al ponerse de pie, formación de coágulos de sangre en las venas (trombosis) y embolia, colapso circulatorio (shock).
Sangre
Cambios en el número de células sanguíneas, tales como: disminución de las células blancas, disminución de las plaquetas, disminución de las células rojas; alteración de la producción de células sanguíneas nuevas en la médula ósea.
Alteración de los niveles de líquidos del cuerpo (deshidratación) y de los niveles de sustancias químicas en la sangre, en particular disminución de los niveles de potasio, de sodio, de magnesio, de cloruro y aumento de los niveles de calcio.
Aumento de los niveles de ácido úrico, gota, aumento de la glucosa en sangre, diabetes, alcalosis metabólica (un trastorno del metabolismo), aumento del colesterol y/o triglicéridos en sangre.
Estómago e intestino
Falta de apetito, boca seca, náuseas, vómitos, molestias estomacales, dolor abdominal, diarrea, disminución de los movimientos intestinales (estreñimiento), ausencia de movimientos intestinales (íleo paralítico), flatulencias.
Inflamación de las glándulas productoras de saliva, inflamación del páncreas, aumento de los niveles de amilasa en sangre (una enzima pancreática).
Coloración amarilla de la piel (ictericia), inflamación de la vesícula biliar.
Cavidad torácica
Insuficiencia respiratoria, inflamación de los pulmones (neumonitis), formación de tejidos fibrosos en los pulmones (enfermedad pulmonar intersticial), acumulación de líquido en los pulmones (edema pulmonar).
Frecuencia "muy rara": dificultad respiratoria aguda (los signos incluyen dificultad respiratoria grave, fiebre, debilidad y confusión).
Sistema nervioso
Vértigo (sensación de que la cabeza te da vueltas)
Convulsiones, nivel bajo de conciencia, coma, dolor de cabeza, mareo.
Apatía, estado confusional, depresión, nerviosismo, agitación, alteraciones del sueño
Sensación poco común de quemazón, cosquillas o hormigueo en la piel.
Debilidad muscular (paresia).
Piel y cabello
Picor, manchas púrpuras en la piel (púrpura), urticaria, aumento de la sensibilidad de la piel a la luz, erupción, erupción facial y/ o zonas enrojecidas que pueden dejar cicatrices (Lupus eritematoso cutáneo), inflamación de los vasos sanguíneos con la consecuente muerte de tejido (vasculitis necrosante), descamación, enrojecimiento, desprendimiento y formación de ampollas en la piel (necrólisis epidérmica tóxica).
Ojos y oídos

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT
P 10023 de 28

Visión amarilla, visión borrosa, empeoramiento de la miopía, disminución de la producción de lágrimas.
Disminución de la visión o dolor en los ojos debido a una presión elevada (signos posibles de acumulación de líquido en la capa vascular del ojo (derrame coroideo) o glaucoma agudo de ángulo cerrado).
Articulaciones y músculos
Espasmos musculares, dolor muscular.
Sistema urinario
Disfunción renal, insuficiencia renal aguda (disminución de la producción de orina y acúmulo de líquidos y desechos en el cuerpo), inflamación del tejido conectivo de los riñones (nefritis intersticial), presencia de azúcar en la orina.
Sexual
Alteraciones de la erección.
General/ Otros
Debilidad general, cansancio, fiebre, sed.

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a:
Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar
ANMAT
https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos
0800-333-1234

5. Conservación de Nebicor® D 5/12,5
Conservar en su envase original a temperatura no mayor de 30°C.

6. Contenido del envase e información adicional

Fórmula:
Cada comprimido recubierto contiene:
Nebivolol clorhidrato (equivalente a 5 mg de nebivolol) 5,45 mg; Hidroclorotiazida 12,5 mg; Cellactose 80 178,85 mg; Croscarmelosa sódica 6,9 mg; Dióxido de silicio coloidal (Aerosil 200) 1 mg; Estearato de magnesio 2,3 mg; Lactosa monohidrato 23 mg; Hidroxipropilmetilcelulosa 2910 4,2 mg; Dióxido de titanio 2,24 mg; Polietilenglicol 400 0,56 mg; Laca alumínica de rojo punzó 4R (CI 16255) 0,02 mg.

Presentaciones:

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial
DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT
Página 10 de 28

Envases conteniendo 14, 28, 30 y 100 comprimidos recubiertos, siendo esta última de uso hospitalario exclusivo.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 57.650

Dr. Lazar & Cía S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5855 B1605 EPI Munro
Directora Técnica: Daniela A. Casas, Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha última revisión del prospecto: .....

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

DANIELA A. CASAS
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
APODERADA

RE-2026-73168715-APN-DTD#JGM
IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT
Página 11 de 28

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-97616672-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 6 de Octubre de 2026

Referencia: EX-2026-22791190 inf pac

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.06 18:20:00 -03:00

Fernando Sebastian Gil Zbinden
Profesional de la Salud
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.06 18:20:01 -03:00