

FLEBOSMINA®

HIDROSMINA

Cápsulas

Industria Argentina

Venta bajo receta

Fórmula:

Cada cápsula contiene:

Hidrosmina 200,00 mg

Estearato de magnesio 2,00 mg

Acción Terapéutica:

Venotónico. Antivaricoso.

Acción farmacológica:

La hidrosmina es un flavonoide obtenido sintéticamente. Su estructura química está relacionada a la diosmina, pero a diferencia de ésta posee una elevada hidrosolubilidad. Las características farmacológicas básicas de la hidrosmina, consisten en reducir el incremento en la permeabilidad vascular provocada por la histamina y la bradiquinina, asimismo reduce la fragilidad capilar aumentada, siendo su potencia de 2 a 3 veces mayor que la diosmina y la hidroxietilrutina respectivamente. En animales con resistencia capilar disminuida la hidrosmina la normaliza con una potencia mayor a la diosmina y rutina. La hidrosmina incrementa el tono venoso con una potencia 10 veces mayor que la hidroxietilrutina y en concentraciones plasmáticas de 10 a 30 µg/ml produce una mejoría evidente sobre la deformación eritrocitaria, acción ésta que no se observa con la diosmina, permitiendo un efecto beneficioso sobre las propiedades reológicas de la sangre, particularmente en pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Sobre el sistema linfático tiene un efecto linfotrópico, reduciendo los síntomas cardinales de la insuficiencia venolinfática.

La hidrosmina resultó superior al placebo en el tratamiento de acúfenos y trastornos auditivos en pacientes con insuficiencia vertebrobasilar.

Indicaciones:

Insuficiencia venosa periférica, síndrome varicoso. Linfedema postmastectomía asociado a fisioterapia.

Posología:

Insuficiencia crónica, síndrome varicoso, síndrome

post-flebitico: 1 cápsula, 2 ó 3 veces al día. Tratamiento de los brotes agudos hemorroidales: se puede duplicar la dosis, 2 cápsulas 3 veces al día. Alteraciones de la fragilidad capilar, oftalmopatías vasculares, dermopatías tróficas: 1 cápsula, 2 ó 3 veces por día. Dosis de mantenimiento: 1 a 2 cápsulas por día.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al principio activo o a algunos de los componentes del producto.

Reacciones Adversas:

No se han descrito. No se han realizado estudios de interacciones con medicamentos o alimentos.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas : (011) 4654-6648 / 4658-7777

Presentaciones:

Envases conteniendo 30 y 60 cápsulas.

Conservación:

Conservar a temperatura inferior a los 25°C y evitar de mantener temperaturas superiores.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 54.525.



Dr. LAZAR y Cia. S.A.Q. e I.

Av. Vélez Sarsfield 5853/5855

B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires

Directora Técnica: Daniela A. Casas,

Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de aprobación del prospecto: 15/5/2008

**36783/5
P140**

