

IBUMULTIN®
IBUPROFENO
Suspensión Oral 2 gramos/100 mililitros
Venta Libre
Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué contiene IBUMULTIN®?

Cada 100 mililitros de Suspensión Oral contiene: Ibuprofeno 2,00 gramos; EDTA Disódico; Benzoato de Sodio; Sacarina sódica; Goma Xhantan; Sorbitol 70%; Glicerina; Rojo punzó; Esencia de frutillas soluble; Esencia de vainilla soluble; Esencia de Banana Soluble; Esencia de Cerezas Soluble; Acido cítrico anhidro; Tween 80; Agua purificada.

¿Cómo actúa IBUMULTIN®?

Calma el dolor. Baja la fiebre. Disminuye la inflamación.

¿Para qué se usa IBUMULTIN®?

IBUMULTIN® suspensión oral se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, de dientes y de cabeza; para resfrios y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o malestar general.

¿Qué personas no pueden recibir IBUMULTIN®?

No se debe utilizar si la persona es alérgica al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Además, las personas con insuficiencia hepática o renal no deben automedicarse con IBUMULTIN®.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

El tratamiento con ibuprofeno puede alterar algunas pruebas de laboratorio, fundamentalmente análisis de sangre.

Advertencias y precauciones

Hable con su médico o farmacéutico si:

Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo "Infecciones").

Infecciones:

IBUMULTIN® puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que Ibumultin pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la

varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

¿Qué cuidados debo tener mientras se está tomando este medicamento?

Consulte con su médico en estos casos:

- Si el niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o antiálgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- Si en el área dolorida hay enrojecimiento o hinchazón.
- Si el dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos.
- Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Si aparecen síntomas nuevos.

Salvo indicación médica específica, no se debe combinar con otros productos analgésicos y/o antitérmicos. No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor. No utilizar contra el dolor de estómago.

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor de estómago, trastornos digestivos), erupción cutánea, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigo y dolor de cabeza.

Si Ud. toma regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

¿Cómo se usa este medicamento?

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad. En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el medicamento con las comidas.

Edad (años)	Peso (Kilos)	Dosis (ml)
2 a 3	11 a 15	5 ml
4 a 5	16 a 21	7,5 ml
6 a 8	21 a 27	10 ml
9 a 10	27 a 32	12,5 ml
Más de 10	Más de 32	15 ml

Menos de 2 años / 11 kg: consulte a su médico.

En caso necesario, la dosis indicada en la tabla puede repetirse cada 8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

¿Tiene usted alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar
ANMAT Responde
0800-333-1234

**MANTENGA ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE
A SU MÉDICO Y/ O FARMACEUTICO**

Forma de Conservación:

Mantener a una temperatura entre 15°C y 30°C, lejos del calor y la luz solar directa.

Presentación:

Suspensión Oral: Envases conteniendo 100 ml.

Especialidad Medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud. Certificado N° 39.587



Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de última revisión de prospecto: 17/06/2021



36858/5
P190