

PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

IBUMULTIN®

IBUPROFENO

Suspensión Oral 4 gramos/100 mililitros

Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento se le ha recetado solamente a usted o a su hijo/a, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué contiene Ibumultin®?

Cada 100 mililitros de Suspensión Oral contiene: Ibuprofeno 4,00 gramos; Benzoato de sodio; Sacarina sódica; Goma Xanthan; Glicerina; Esencia de naranja soluble; Sorbitol 70%; Colorante amarillo oca; Ácido cítrico anhidro; Polisorbato; Agua purificada

¿Cómo actúa Ibumultin®?

Calma el dolor. Baja la fiebre. Disminuye la inflamación.

¿Para qué se usa Ibumultin®?

Ibumultin® suspensión oral está indicado para el tratamiento del dolor: dolores de cabeza, dolores dentales, dolores post-operatorios, dolores menstruales y estados febriles.

También está indicado en la artritis reumatoide (incluyendo artritis reumatoide juvenil) espondilitis anquilopoyética, artrosis y otros procesos reumáticos agudos o crónicos, así como en otras patologías de músculo (torceduras y esguinces) y hueso en que se produzca dolor e inflamación

¿Qué personas no pueden recibir Ibumultin®?

No se debe utilizar si la persona es alérgica al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Dichas reacciones podrían ser: erupción cutánea con picor, hinchazón de la cara, labios o lengua, secreción nasal, dificultad respiratoria o asma.

Si ha tenido una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno o ha sufrido una perforación del aparato digestivo.

Si padece insuficiencia cardíaca grave.

Si se encuentra en el tercer trimestre del embarazo.

Dr. LAZAR y Cia. S.A.
Química e Industrial


DANIELA A. CASAS
DIRECTORA TÉCNICA


ELENA RUY ZIFFER
7/7/2020

IP-2020-51233878-APN-DGA#ANMAT

Si usted tiene una enfermedad grave del hígado o los riñones.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

El tratamiento con ibuprofeno puede alterar algunas pruebas de laboratorio, fundamentalmente análisis de sangre.

Advertencias y precauciones

Hable con su médico o farmacéutico si:

Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo “Infecciones”)

Infecciones:

Ibumultin puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que Ibumultin pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

¿Qué cuidados debo tener mientras se está tomando este medicamento?

Consulte con su médico en estos casos:

- Si se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- Si en el área dolorida hay enrojecimiento o hinchazón.
- Si el dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos.
- Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Si aparecen síntomas nuevos.

Salvo indicación médica específica, no se debe combinar con otros productos analgésicos y/o antitérmicos. No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor. No utilizar contra el dolor de estómago.

Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En algunos pacientes pueden ocurrir con mayor frecuencia trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor de estómago, trastornos digestivos), erupción cutánea, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigo y dolor de cabeza.

Dr. LAZAR y Cia. S.A.
Química e Industrial


DANIELA A. CASAS
DIRECTORA TÉCNICA


ELENA RUY ZIFFER
DIRECTORA TÉCNICA

IP-2020-51233878-APN-DGA#ANMAT

Si Ud. toma regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

¿Cómo se usa este medicamento?

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

-NIÑOS: a. Antipirético: 1) Si la temperatura es menor a 39°C (axilar), se recomienda administrar una dosis de 0.125 ml por cada kilogramo de peso corporal (equivalente a 5 mg de ibuprofeno/kg/dosis) cada 6 a 8 horas. 2) Si la temperatura es igual o mayor a 39°C (axilar), se recomienda administrar una dosis de 0.25 ml por cada kilogramo de peso corporal (equivalente a 10 mg de ibuprofeno/kg/dosis) cada 6 a 8 horas.

Recordar que cada mililitro de suspensión de Ibumultin® al 4% contiene 40 mg de ibuprofeno.

Tabla de orientación sugerida:

Peso	Temp. menor a 39°C	Temp. igual o mayor a 39°C	Espacio entre dosis
Niños de 20 kg	2,5 ml	5 ml	6 a 8 horas
Niños de 30 kg	4 ml	7,5 ml	6 a 8 horas

b. Dolores leves a moderados, artralgias y artritis reumatoidea: 3) 20 a 40 mg/kg/día, divididos cada 6 a 8 horas (0,12 ml/kg a 0,25 ml/kg cada 6 a 8 horas). 4) En pacientes con Artritis Reumatoidea Juvenil con dolores leves, se recomienda emplear una dosis de 20 mg/kg/día.

Dosis Máximas recomendadas: 40 mg/kg/día (1 ml/kg/día)

Importante: debe agitarse el frasco antes de su uso.

- ADULTOS: a. Analgésico –Antipirético: 10 ml (400 mg) cada 6 a 8 horas. B) Dismenorrea: 10 ml (400 mg) cada 4 horas. C) Artritis Reumatoidea-Osteoartritis: 1200-3200 mg/día dividido en tres a cuatro tomas.

Recordar que 10 ml de IBUMULTIN® suspensión 4% contienen 400 mg de ibuprofeno.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

¿Tiene usted alguna pregunta?

Laboratorio Dr. Lazar
011-5550-2900
www.lazar.com.ar
ANMAT Responde

Dr. LAZAR y Cia. S.A.
Química e Industrial

 

DANIELA A. CASAS
DIRECTORA TÉCNICA

ELENA RUT ZIFFER
7777-7777

IP-2020-51233878-APN-DGA#ANMAT

MANTENGA ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/ O FARMACEUTICO

Forma de Conservación: Mantener a una temperatura entre 15°C y 30°C, lejos del calor y la luz solar directa.

Presentación:

Suspensión Oral: Envases conteniendo 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150 y 240 ml

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 39.587

Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sársfield 5855 - B1605 EPI Munro
Directora Técnica: Daniela A. Casas, Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de aprobación de prospecto:

Dr. LAZAR y Cía. S.A.
Química e Industrial

 

DANIELA A. CASAS
Elena Ruy Ziffer
DIRECTORA TÉCNICA

IP-2020-51233878-APN-DGA#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-50782059 INF PTE SUSP 4%

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.